

CONTRIBUTION À LA FLORE DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE,

PAR M. A. GUILLAUMIN.

XXXVI. PLANTES RECUEILLIES PAR M. FRANC (Suite)⁽¹⁾.

Rubiacées.

- Bikkia campauulata* Guillaum. — Prony (1536 A, 1826 A).
B. tubiflora Schltr. — Mont Dzumac (1977).
Oldenlandia Crateogonum Guillaum. — Dombéa : Nondoué (2118).
Cælospermum corymbosum Baill. — Prony (1589 A).
Gardenia Aubryi Vieill. — Prony (1493 A, 1627 A).
La résine entre dans la composition du baume néo-calédonien.
Atractocarpus heterophyllus Guillaum. et Beauvis. — Prony (1639 A,
1766 A).
Guettarda hypolasia Baill. — Prony (272 bis A, 1692 A, 1874).
G. speciosa L. — Port boisé (1590 A).
Timonius erimius Schltr. — Prony (1577 A) « Pomme acajou ».
T. glabrescens Schltr. — Prony (1755 A).
Ixora cauliflora Montr. — Prony (1699, 1699 A).
I. Francii Schltr. — Prony (240, 240 A).
I. yahouensis Schltr. — Yahoué (895 A).
Chomelia leioloba Guillaum. — Prony (1786).
Ch. rhyalostigma Guillaum. — Prony (1904).
Morinda choriophylla Baill. — Prony (1883^a).
M. citrifolia L. — Prony (1796 A) « Fromager ».
Psychotria cardiochlamys Schltr. — Prony (1623 A).
P. lyciflora Schltr. — Farino (723 A).
P. rupicola Schltr. — Prony (1818).
P. subuniflora Schltr. — Prony (1719, 1719 A).
Mormandia neo-caledonica Hook. f. — Mont Mou (294), Prony (294 A).
Spermacoce verticellata L. — Prony (1834 A).

⁽¹⁾ Voir *Bull. Mus.* 1920, p. 254; 1921, p. 119.

Composées.

- Vernonia cinerea* Less. — Prony (1759 A).
Epaltes australis Less. — Ouen Toro (2133).
Helichrysum neo-caledonicum Schltr. — Païta (455 A).
Parthenium Hysterophorus L. — Nouméa (628, 628 A).
Eclipta erecta L. — Prony (1833).
Wedelia biflora DC. — Prony (220).
W. uniflora S. Moore = *Lipochoeta lifuana* Hochr. — Nouméa (2113);
Prony (1926).
Bidens pilosa L. — Nouméa (2131).
Glossogyne tenuifolia Cass. — Nouméa (2133).

Codéniacées.

- Scavola Balansæ* Guillaum. — Prony (1675 A).
S. Bechii Zhalbr. — Prony (47 A, 1531 A).
S. cylindrica Schltr. et Krause. — Prony (1560 A, 1651 A, 1872, 1900).
S. montana Labill. — Port boisé (1983).

Épaëridacées.

- Leucopogon albicans* Brong. et Gris. — Mont Dzumac (62 A).
L. cymbulæ Labill. — Prony (1573 A) « *Tiamie* ».
L. dammarifolius Brong. et Gris. — Prony (246).
L. longistylis Brong. et Gris. — Prony (407 A, 1660 A).
L. salicifolius Brong. et Gris. — Prony (152 A).
Dracophyllum amabile Brong. et Gris. — Prony (1868).
D. gracile Brong. et Gris. — Prony (1825 A).
D. involucreatum Brong. et Gris. — Prony (1518 A).

Plombaginacées.

- Plumbago zeylanica* L. (sans étiquette).

Myrsinacées.

- Rapanea asymmetrica* Mez. — Prony (105 A, 1520), bords de la Ouanéoué (105).
R. macrophylla Mez. — Prony (1538 A).
R. modesta Mez. — Mont Dzumac (525^a).
R. novo-caledonica Mez. — Nouméa (1379 A).
Tapinosperma robustum Mez. — Prony (1563 A) « *Hêtre moucheté* ».

Sapotacées.

- Ochrothallus Fournieri* Dub. — Prony (1742 A) « Cormier ».
Chrysophyllum Francii Dub. et Guillaum. — Plaine des lacs (689 A).
Ch. lissophyllum Pierre. — Prony (1938).
Planchonella Baillonii Dub. — Prony (202 A).
P. Balansæana Pierre. — Prony (1729, 1729 A).
P. Baueri Dub. — Prony (1728 A).
P. crebrifolia Pierre. — Prony (1721 A).
P. Endlicheri Guillaum. — Prony (1643 A) « Azou blanc ».
P. lasiantha Dub? — Prony (1711 A, 1871) « Azou ».
P. Sebertii Dub. — Prony (1523 A, 1682 A).
Sarcolepus Balansæanus Pierre. — Prony (1800) « Azou rouge ».
Manilkara Pancheri Pierre mss. = *Mimusops Pancheri* Baill. — Prony (1617 A) « Bunier ».

Ébénacées.

- Maba glauca* Montr. — Prony (1504 A).
M. parvifolia Schltr. — Prony (1696 A).
Diospyros montana Panch. et Seb. — Prony (1831 A).

Styracacées.

- Symplocos flavescens* Brand. — Prony (1632 A).
S. nitida Brong. et Gris. — Col Ravau (777).

Oléacées.

- Jasminum pulchrefoliolatum* Guillaum. — Prony (1935).
Notelea Badula Vieill. — Prony (114 A).

Apocynacées.

- Melodinus Balansæ* Baill. — Prony (97 A).
Schlechter (in herb.) a voulu considérer cette plante comme le type d'une espèce nouvelle *latifolius*, mais les échantillons montrent une très grande variété dans la taille des feuilles.
M. scandens Schltr. — Nouméa (100 A).
Rauwolfia semperflorens Schltr. — Prony (1678 A).
Alyxia clusiophylla Guillaum. — Plaine des Lacs (1988).
A. laurina Guillaum. — Prony (1727 A).
A. leucogyne Guillaum. — (1807 A).
Cerbera Odollam Gærtn. — Prony (1830 A) « Faux Manguier ».
Pterochrosia Vicillardii Baill. — Prony (545).

- Ochrosia miana* Baill. — Prony (1626 A, 1756 A).
Alstonia Vieillardii v. Heurck et. Müll. Arg. — Prony (44 A).
Tabernaemontana cerifera Panch. et Seb. — Prony (1778 A).
Parsonsia variabilis Baill. — Prony (1652^a A).

Asclépiadacées.

- Marsdenia ericoides* Schltr. — Plaine des Laes (1864).
M. Billardieri Dene. — Prony (575 A).

Loganiacées.

- Fagraea grandis* Panch. et Seb. — Prony (621 A) = *Tabou-*

Gentianacées.

- Erythraea australis* R. Br. — Prony (1876).

Boraginacées.

- Tournefortia argentea* L. f. — Prony (1550 A, 1795 A).

Convolvulacées.

- Polymeria psilla* R. Br. — Ouen Toro (2098).
Cuscuta australis R. Br.? sur *Mimosa pudica* L. — Tounghoué (737 A).

Solanacées.

- Solanum auriculatum* Ait. — Nouméa (215).
Physalis peruviana L. — Prony (302 A, 1770 A).
Duboisia myoporoides R. Br. — Prony (871 A).

Gesnéracées.

- Coronathera pulchella* C. B. Clarke. — Prony (1745 A)

Bigoniacées.

- Diplanthera Deplanchei* F. Muell. — Prony (214 A).

Myoporacées.

- Myoporum tenuifolium* Forst. — Nouméa (1378).

Verbénacées.

- Stachytrophia indica* Vahl. — Nouméa (1672 A) «Herbe bleue».
Verbena Bonariensis L. — Prony (1693 A).
Premna integrifolia L. — Ouen Toro (2100).
Oxera neriifolia Beauvis. — Prony (700 A).
O. palmatinervis Dub. — Prony (542 A).
Avicennia officinalis L. — Nouméa (2127).